






## โรงพยาบาลหนองหาน

### FORM

ชื่อเรื่อง	แบบประเมินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวของมีคม สัมผัสสารคัดหลั่ง ของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รหัสเอกสาร	FORM-ICC-003

 (นางสาววารุณี ยาคง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	 (พญ.กรปรียา ชินรัตนลาภ) นายแพทย์ชำนาญการ	 (นพ.ธงศักดิ์ มีเพียร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ

วันที่อนุมัติใช้ ... ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ .....

**แบบประเมินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากของมีคม สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน  
โรงพยาบาลหนองหาน อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี**

แนวทางการปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
<b>การเย็บแผล</b> ๑. ไม่จับเข็มด้วยมือโดยตรงให้ใช้คีมจับเข็ม (needle holder) จับทุกครั้ง ๒. การใส่ไหมัด ให้ใช้คีมจับไหมัดสวมเข้ากับด้ามมืด ๓. ไม่เย็บแผลใต้หว่างนิ้วมือช่วยกดแผล ให้ใช้ forcep ช่วยกดแผล			
<b>การทิ้งเข็มและของมีคม</b> ๑. ไม่สวมปลอกเข็มกลับ ปลดเข็มฉีดยาหรือไหมัดออกจากด้ามมืด โดยใช้ clamp หรือใช้อุปกรณ์สำหรับปลดเข็ม ๒. หากจำเป็น ต้องสวมปลอกเข็มให้สวมเข็มด้วยวิธีมือเดียว (One - handed technique) โดยใช้ปลายเข็มเกี่ยวปลอกขึ้นมา ตั้งเข็มและปลอกขึ้น จนปลอกสวมลงไปสนิท ๓. ทิ้งเข็ม ไหมัดและของมีคมที่ใช้แล้วลงในภาชนะสำหรับทิ้งเข็มและของมีคมที่ป้องกันการทะลุ ๔. ห้ามวางหรือหงายส่วนแหลมคมของเข็มขึ้น หรือยื่นออกมานอกภาชนะรองรับ			
<b>ภาชนะที่ทิ้งเข็มหรือของมีคม</b> 1. บรรจุเข็มหรือของมีคมเกิน 3 ใน 4 ของภาชนะ เมื่อบรรจุถึงระดับที่กำหนดแล้วให้ปิดฝาและปิดผนึกก่อนนำไปทำลาย 2. การทิ้งเข็มและของมีคมไม่ควรให้มือหรือนิ้วเข้าไปในภาชนะ 3. ปิดผนึกภาชนะที่บรรจุเข็มและของมีคมซึ่งเต็มแล้วนำไปไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย 4. หลังปิดภาชนะแล้วห้ามเปิดเพื่อเทเข็มและของมีคมทิ้งแล้วนำกลับไปใช้ซ้ำหรือนำไปจำหน่าย			

แบบประเมินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตจากของมีคม สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน  
โรงพยาบาลหนองหาน อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แนวทางการปฏิบัติ	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p>การปฏิบัติหลังจากอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดและสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย</p> <p>1. ถ้าถูกเข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตำหรือบาด ให้ล้างบาดแผล ด้วยน้ำสบู่ หรือ 4% Chlorhexidine และทาแผลด้วย 70% Alcohol หรือ 10% Iodophore ห้ามบีบเค้นเพื่อให้เลือดออกมา</p> <p>2. ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นถูกผิวหนังไม่ว่าจะมีบาดแผลหรือไม่ก็ตาม ให้ล้างบริเวณ นั้นด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด หากพบว่ามีบาดแผลให้ใช้ 4% Chlorhexidine ฟอกล้างให้สะอาด และทาด้วย 70% Alcohol หรือ 10% Iodophore</p> <p>3. ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้าตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือ 0.9% NSS มากๆ (ถ้าหากใส่ คอนแทคเลนส์ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดก่อนถอดคอนแทคเลนส์)</p> <p>4. ถ้าเลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนน้ำลายออกแล้วล้างปาก ถูคอด้วยน้ำสะอาด หลายๆ ครั้ง</p> <p>5. รายงานหัวหน้างาน/หัวหน้าเวร/ICN</p>			

หมายเหตุ ICWN รับผิดชอบเก็บรวบรวมส่ง ทีม IC ทุกเดือน